Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales

**CÁLCULO ESTADÍSTICO Y
BIOMETRÍA**

Variable aleatoria

Dado un espacio muestral Ω asociado a un experimento aleatorio, se define como V.A. a toda función que aplica a cada resultado del Ω un numero real.

Es asociarle un número a cada resultado de un experimento aleatorio.

	Ejemplo 1	Ejemplo 2
Experimento aleatorio	Tirar dos dados	Extraer 4 frutos clasificándolos en sano/enfermo
Espacio muestral	$\{(1,1); (1,2); (1,3); \dots ; (6,6)\}$	$\{(S,S,S,S); (S,S,S,E); (S,S,E,S); \dots ; (E,E,E,E)\}$
Variable aleatoria	Suma de puntos	Nro. de frutos enfermos
Recorrido V.A.	$\{2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12\}$	$\{0,1,2,3,4\}$

Asignarle un probabilidad a cada valor del recorrido de una V.A. (X) es encontrar la Distribución de probabilidad de esa V.A.

P(X): función de cuantía o función de distribución de probabilidades

Distribución de variables aleatorias

- **Función de distribución de probabilidad $f(x)$**
- **Función de densidad $f(x)$**
- **Función de distribución (acumulada) $F(x)$**

Función de distribución de probabilidad

- *La función de distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta (X), denotada por $f(x)$, es una función $f: \mathcal{R} \rightarrow [0,1]$ tal que:*

$$f(x) = \begin{cases} P(X = x) & \text{si } x \in C \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

donde $C = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ es el conjunto de valores que puede asumir la variable aleatoria X

Función de densidad

- *La función de una variable aleatoria continua (X) denotada por $f(x)$ es una función densidad si se cumple:*

- $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}_x$

- $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cdot dx = 1$

- $P(x_1 < X < x_2) = \int_{x_1}^{x_2} f(x) \cdot dx$

Función de distribución acumulada

- La distribución de una variable aleatoria, independientemente del tipo de variable, puede representarse también por su **función de distribución acumulada**, denotada como $F(x)$. Esta función asigna a cada valor de la variable un valor entre 0 y 1 que indica la probabilidad de que la variable, observada para un caso particular, asuma un valor menor o igual al valor en que se está evaluando la función.

Repaso de conceptos

Experimento: Observar 3 semillas y registrar su estado sanitario.

- Cada semilla puede estar: sana (S) o enferma (E)
- Hay 8 resultados posibles que conforman el espacio muestral:

$$\Omega = \{SSS, SSE, SES, ESS, SEE, ESE, EES, EEE\}$$

- Si definimos la variable aleatoria (X) como el “*número de semillas enfermas*”
- *Los valores de la V.A. serán:* 0 1 2 3

Repaso de conceptos

x	$p(x)$ o $f(x)$	$F(x)$
0	1/8	1/8
1	3/8	4/8
2	3/8	7/8
3	1/8	8/8
	8/8 = 1	

- *Distribución de probabilidades: pares de valores $[x_i; P(x_i)]$*
- *Función de probabilidades: columna $P(x)$ o $f(x)$*
- *Función de distribución acumulada: columna $F(x)$*

Esperanza y Varianza

- Si bien las funciones de probabilidad y de densidad, de las variables aleatorias discretas y continuas, contienen toda la información sobre los procesos que generan los datos de la variable, usualmente es conveniente resumir las principales características de la distribución.
- Para todas las distribuciones existen valores numéricos (constantes) que se denominan parámetros de la distribución.

Media teórica o Esperanza

$$E(X) = \mu_X = \sum_{\forall x \in R_x} x \cdot p(x)$$

Algunas Propiedades:

$$E(a+b.X) = a + b.E(X)$$

$$E(X+Y) = E(X) + E(Y)$$

Varianza

$$V(X) = \sigma_X^2 = E[(x - \mu)^2]$$

$$V(X) = E[X^2] - [E(X)]^2 = \sum_{\forall x \in R_x} x^2 \cdot p(x) - \mu^2$$

Algunas Propiedades:

$$V(a+b.X) = b^2.V(X)$$

Distribución Binomial

- La **distribución Binomial** puede usarse para el cálculo de probabilidades de eventos provenientes de conteos acotados.
- Se origina cuando se cuentan el número de “Éxitos” en “n” experimentos independientes cuyos resultados posibles son: éxito o fracaso y el éxito tiene una cierta probabilidad (p) de ocurrencia (cada uno de estos ensayos se lo conoce como **ensayo Bernoulli**)

Función de probabilidad

La función de probabilidad de una variable aleatoria X que se distribuye como una Binomial puede expresarse como:

$$f(x;n,p) = \begin{cases} \binom{n}{x} \cdot p^x \cdot (1-p)^{n-x} & \text{si } x = 0,1, \dots, n. \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

Siendo: p la probabilidad de éxito

n el número de ensayos

$(1 - p) = q$ la probabilidad de fracaso, por lo tanto $p + q = 1$

Los parámetros de la distribución Binomial son n y p

$$E(X) = n \cdot p$$

$$V(X) = n \cdot p \cdot (1-p)$$

Ejercicio 1

- Si se quiere calcular la probabilidad de que al tirar 20 veces una moneda se obtengan exactamente 12 caras, es decir, $P(X = 12)$

Dado que **1)** los resultados de cada ensayo sólo pueden pertenecer a la categoría "éxito" o "fracaso", **2)** los n ensayos son independientes, y **3)** la probabilidad de ocurrencia (éxito), permanece constante en cada ensayo.

$$P(X = x) = C_x^n p^x (1 - p)^{n-x}$$

$$P(X = 12) = C_{12}^{20} 0,5^{12} (1 - 0,5)^{20-12} = 0,1201$$

Ejercicio 2

- En un monte frutal 20% de los árboles están enfermos. Si vamos a elegir una muestra de 5 árboles queremos estudiar como será la V.A. 'nro. árboles enfermos en la muestra'

X	0	1	2	3	4	5
P (x)	0,3277	0,4096	0,2048	0,0512	0,0064	0,00032

$$P(X = 1) = C_1^5 \cdot 0,2^1 \cdot 0,8^4 = 0,4096$$

$$\mu = n \cdot p = 5 \cdot 0,2 = 1$$

$$\sigma^2 = n \cdot p \cdot q = 5 \cdot 0,2 \cdot 0,8 = 0,8$$

$$X \sim B(n;p)$$

Distribución Poisson

- La distribución de Poisson también sirve como modelo para variables discretas de tipo conteo.
- A diferencia de la Binomial, donde el conteo se realizaba sobre n experimentos independientes, en el caso de la Poisson, los conteos se refieren al número de veces que un evento ocurre en una unidad de tiempo o espacio dados (horas, kilo, m^2 , m^3 , planta, etc.).
- Se puede presentar como una forma límite de la distribución Binomial en situaciones donde p es pequeño ($p \rightarrow 0$) y n muy grande o incluso imposible de determinar ($n \rightarrow \infty$).

Función de probabilidad

La función de probabilidad de una variable aleatoria X que se distribuye como una Poisson puede expresarse como:

$$f(x;\lambda) = \begin{cases} \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} & \text{siendo } x = 0, 1, \dots, n. \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

Donde: e es una constante (base del logaritmo natural): 2,71828...

Como puede observarse desde la función, el **único parámetro de la distribución Poisson es λ** .

$$\mathbf{E(X) = V(X) = \lambda = n \cdot p}$$

Ejercicio 3

- En un monte frutal durante un monitoreo de rutina se observa el número de ácaros presentes por hoja. Se conoce que el número medio de ácaros por hoja es 2,1. Se pregunta:
 - Obtener la probabilidad de no hallar ningún ácaro por hoja.
 - Calcular la probabilidad de encontrar menos de 2 ácaros por hoja.
 - Obtener la varianza de la V.A.

Ejercicio 4

- En un monte frutal durante un monitoreo de insectos defoliadores se revisan 20 hojas y se encuentran:

X "Insectos por hoja"	0	1	2	3	4
f(x) N° de hojas	8	6	4	1	1

- Deducir a que distribución teórica se ajusta la V.A.
- Obtener la probabilidad para cada valor de la V.A.
- Calcular las Frecuencias Teóricas o esperadas si la V.A. se ajusta a la distribución deducida.