



Paso a paso

Cómo obtener un arbusto de sen
de campo (*Senna corymbosa*)

Recolectar vainas maduras a fines de
verano-otoño



Sacar las semillas de las vainas y limpiarlas



Escarificar muy suavemente y colocar en remojo por un día



Germinación

- Colocar las semillas sobre un sustrato liviano y tapar con una capa equivalente al tamaño de la semilla.
- Dejar el recipiente en un lugar cálido y mantener el sustrato húmedo.



Marcela Simontacchi

Repique

- Desmenuzar con cuidado el pan de tierra y colocar cada plantín en una maceta.
- Durante los primeros días mantener las macetas protegidas del sol directo.



Interacciones



"Lechera grande"




polinizadores



Celestino



"Limoncito"



SEN DEL CAMPO (*Senna corymbosa*)

Su follaje perenne es muy beneficioso para el celestino (*Thraupis sayaca*), pájaro que debe su nombre al color de sus alas. Los abejorros del género *Bombus* poseen el monopolio de la polinización de sus flores. A la madrugada ya se escucha el zumbido casi ensordecedor de estos “amenazantes” pero necesarios visitantes. En cambio las hojas de esta planta son alimento de las orugas de un extraordinario elenco de coloridos lepidópteros diurnos. Ellos son la mariposa cebrina (*Colobura dirce*), limoncito de faja (*Eurema elathea*), azufrada grande (*Phoebis philea*), mancha azufre (*Anteos clorinde*), lechera grande (*Glutophrissa drusilla*), azufrada común (*Phoebis sennae marellina*), azufrada naranja (*Phoebis argante argante*), blanquita (*Eurema albula sinoe*), limoncito común (*Eurema deva deva*), coluda de triángulo (*Chioides catillus catillus*) y la enlutada de blanco (*Erynnis funeralis*).

Es muy fácil de cultivar, resiste muy bien las heladas, tolera las sequías y crece de lo mejor en suelos húmedos. En el jardín es conveniente plantarlo en un lugar soleado y con reparo de los vientos, de lo contrario se corre el riesgo de que se vuelque. Arbusto o arbolito que suele crecer hasta los 2 metros de altura y con una anchura similar. FOLLAJE: perenne y verde claro. HOJAS: compuestas, pinnadas y con los folíolos lanceolados. FLORES: amarillas, de unos 2 centímetros de diámetro. Se agrupan en racimos. FLORACIÓN: muy abundante y sucede durante el verano. FRUTO: vaina cilíndrica de unos 10 cm de largo con aproximadamente una veintena de semillas en su interior. Maduran a fines del verano y comienzos del otoño.

NOMBRES VULGARES: cañafístula y rama negra, este último debido al color oscuro de su ramaje. FAMILIA: al igual que las acacias y los algarrobos pertenece a la familia de las fabáceas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: sur de Brasil, Uruguay y la Mesopotamia argentina. En la provincia de Buenos Aires solo crece en el noreste, desde San Nicolás hasta Miramar, en los claros y bordes de los talares de los bosques ribereños y en matorrales.

Aprendelta – CONOCIENDO LAS PLANTAS DEL DELTA, Texto: Alejandro Galup.